


Legame covalente negli alogenuri di argento



Concetti chimici:

- Legame chimico
- Solubilità alogenuri



20 min

Materiale occorrente

- Nitrato di argento, AgNO_3
- Fluoruro di calcio, CaF_2
- Cloruro di sodio, NaCl
- Bromuro di potassio, KBr
- Ioduro di potassio, KI



Norme di sicurezza

- Usare guanti ed occhiali di protezione

Richiami teorici

Quando due atomi condividono una coppia di elettroni, si dice che essi formano un legame covalente singolo. La condivisione di due e tre coppie di elettroni corrisponde rispettivamente ad un legame doppio e triplo. Nel legame covalente tra due atomi uguali la coppia di elettroni è condivisa equamente e il legame è detto apolare. Nel legame tra due atomi diversi, invece, gli elettroni sono più vicini ad un atomo che all'altro. In questo caso si dice che il legame covalente è polarizzato perché l'atomo che attrae di più a sé gli elettroni assume una leggera carica negativa, mentre l'altro atomo ha una debole carica positiva. La capacità di un atomo di attirare a sé gli elettroni di legame è detta **elettronegatività (EN)**. Tanto maggiore è la differenza di elettronegatività tra due atomi, tanto maggiore è il carattere polare del legame covalente che essi formano. Per differenze di EN molto elevate si ha infine un legame di tipo ionico, dove l'atomo più elettronegativo è sotto forma di ione negativo (anione) e l'altro sotto forma di ione positivo (catione). Il fluoro è l'elemento con la maggiore elettronegatività della tavola periodica. Per quanto riguarda gli altri alogeni, cloro, bromo e iodio, la scala dell'elettronegatività è la seguente:



Consideriamo gli alogenuri di argento: AgF , AgCl , AgBr , AgI . Poiché $\text{EN}(\text{Ag})$ è sempre uguale, man mano che la differenza di elettronegatività tra l'argento e l'alogeno diminuisce (passando dal fluoro al cloro, al bromo e allo iodio), diminuisce anche il carattere polare del legame covalente. Una conseguenza di questo fatto è la diminuzione della solubilità degli alogenuri di argento in acqua: AgF è dunque il composto più solubile, seguito da AgCl , poi da AgBr ed infine AgI .

Esecuzione dell'esperienza



In 4 provette si preparano 4 soluzioni di nitrato di argento (AgNO_3), sciogliendo una punta di spatola di AgNO_3 in 4-5 mL di H_2O . In altre 4 provette si preparano le soluzioni degli alogenuri:

1. sciogliendo una punta di spatola di CaF_2 in 4 o 5 mL di acqua;
2. sciogliendo una punta di spatola di NaCl in 4 o 5 mL di acqua;
3. sciogliendo una punta di spatola di KBr in 4 o 5 mL di acqua;
4. sciogliendo una punta di spatola di KI in 4 o 5 mL di acqua;

Si agita con una bacchetta fino a completa dissoluzione e, quindi, si versano le soluzioni di nitrato di argento in quelle degli alogenuri. Immediatamente si osserva che nelle provette 2, 3, 4, contenenti rispettivamente NaCl , KBr , KI , si ha la formazione di un precipitato, mentre in quella contenente il fluoruro di calcio non si vede la precipitazione di alcun solido.

Cosa è accaduto?

Nelle quattro provette in cui si aggiunge la soluzione di nitrato di argento a quella di un alogenuro avvengono le seguenti reazioni:



Il composto AgF è molto solubile, mentre nei tre casi successivi si osserva la formazione di precipitati gradualmente più abbondanti e colorati in relazione alla diminuzione del carattere polare del legame covalente.

